



Digitized by the Internet Archive
in 2012 with funding from
Agriculture and Agri-Food Canada – Agriculture et Agroalimentaire Canada

<http://www.archive.org/details/guidepourlpurati00cana>

GUIDE POUR L'ÉPURATION DES POULES

RETENEZ LES MEILLEURES ET VENDEZ LES AUTRES

L'ÉPURATION EST PROFITABLE

L'épuration permet d'enlever du troupeau toutes les poules qui ne pondent pas et les mauvaises pondeuses. Les sujets de pauvre qualité sont gardés aux dépens des bons. Tout le troupeau peut constituer une perte si l'on ne pratique pas l'épuration.

L'épuration réduit les frais d'alimentation. Avec une production de 60 p. 100 il faut environ 20 p. 100 moins d'aliments par douzaine d'œufs produits qu'avec une production de 40 p. 100.

Les oiseaux manifestant des symptômes de maladie doivent être détruits sur-le-champ; s'ils sont laissés dans le troupeau, ils risquent de contaminer les oiseaux sains.

LA TÊTE D'UNE BONNE PONDEUSE

REMARQUE—TÊTE BIEN DESSINÉE, ŒIL PLEIN, BRILLANT ET CRÊTE ROUGE



NOURRISSEZ POUR LA PRODUCTION—PUIS ENLEVEZ LES MAUVAISES PONDEUSES

Ne gardez que les oiseaux sains et normaux pour la ponte. Attendez une couple de mois après la mise des oiseaux dans le poulailler pour connaître le comportement du troupeau; puis commencez à enlever les oiseaux qui ne profitent pas de la bonne alimentation et des bons soins. Continuez à épurer systématiquement une fois par mois pendant toute la saison.

Il est difficile d'épurer efficacement un troupeau mal nourri et faible, ou un troupeau qui mue. Alimentez-le pour la production des œufs, puis épurez.

La présente circulaire fut préparée tout d'abord par le personnel du Département de l'aviculture du Collège d'agriculture de l'Ontario, à Guelph, et les illustrations furent fournies par le Service photographique du même Collège. Étant donné l'intérêt manifesté pour cette publication, on s'est entendu avec le ministère de l'Agriculture de l'Ontario pour la faire réimprimer.

CANADA — MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

DIVISION DES BESTIAUX ET DES VOLAILLES — SERVICE DE LA PRODUCTION, OTTAWA

PUBLICATION 842

JUIN 1958

RÉIMPRESSION

25M-23673-5;58

630.4
C212
P 842
1950
(impr.
1958)
fr.
c. 3

GARDEZ LES BONS



Crête pleine, abdomen profond, plumes usées, pattes et bec blanchâtres — pond régulièrement.

LEGHORNS BLANCHES



Crête ratatinée, corps peu profond, pattes et bec jaunes, en mue — ne pond pas.



Tête bien dessinée, corps rectangulaire — en bon état de ponte.

PLYMOUTH-ROCKS BARRÉES



Tête grasse, plumes lisses et abdomen affaissé — une mauvaise pondeuse.



Alerte, à plumes serrées — en excellent état de ponte.

NEW-HAMPSHIRE

A remarquer la ressemblance et l'apparence générale des trois oiseaux désirables (à gauche). Les mauvais oiseaux (à droite) sont de trois différents types: étroit, gras et rond, respectivement—ils se rencontrent dans toutes les races.



Tête petite, ronde, corps court, pattes jaunes — mauvaise pondeuse.

L'anus d'une poule pondeuse est gros, dilaté et humide. L'anus d'une poulette commençant à pondre et d'une poule qui ne pond plus est petit et sec.



Anus d'une forte pondeuse.



Anus d'une non-pondeuse.

La capacité ou la profondeur de l'abdomen atteint son maximum lorsque la poule est en pleine ponte.



Bonne et mauvaise capacité.

La distance entre les os pubiens augmente lorsque la poule commence à pondre.



Bonne et mauvaise distance.

Chez les races à peau jaune, le pigment blanchit suivant la production et revient après que la ponte cesse.



Pattes blanchâtres attribuables à une forte production (à gauche). Mauvaise pondeuse avec pigments jaunes (à droite).

Une poule en pleine ponte a une peau mince, molle, peu serrée, tandis que celle qui ne pond pas peut être dure avec gras.



Peau mince et blanchâtre attribuable à une forte production (à gauche). Peau jaune et abdomen gras d'une mauvaise pondeuse (à droite).

TABLEAU D'ÉPURATION

	Bonne pondeuse	Mauvaise pondeuse
Santé	Active. Alert. En bonne chair	Inactive. Maigre. Trop grasse
Plumage	Usé. Cassé. Fané	Brillant. Doux. Lustré
Mue	Mue tardive et rapide	Mue hâtive et lente
Couvaison	Couveuse rarement ou à peu près jamais	Couveuse souvent
Tête	Bec gros et court. Crâne plat. Longueur et largeur moyennes	Petite. Ronde. Étroite. Tête de corneille. Grossière
Crête	Pleine. Cireuse. Rouge vif	Ratatinée. Pâle. Écailleuse
Face	Bien dessinée, pleine mais maigre	Charnue. Déprimée
Oeil	Gros. Saillant. Brillant	Petit. Terne. Déprimé
Corps	Profondeur moyenne, en bonne chair. Dos long, large et plat	Peu profond. Court. Étroit. Dos rond
Abdomen	Plein, bonne capacité. Peau mince, douce et serrée	Lâche, pauvre capacité. Épais, dur et gras
Anus	Gros. Humide. Dilaté	Petit. Sec. Rentré
Tarses (pattes)	Minces, plats, lisses. Blanchâtres chez les oiseaux à peau jaune	Grossiers et ronds. Jaunes chez les oiseaux à peau jaune

L'ŒIL = FACTEUR D'ÉPURATION

Chez les oiseaux adultes sains de la plupart des races ordinaires, l'œil normal est de couleur baie. Par suite de divers désordres, — vers intestinaux, coccidiose, leucose, — la couleur de l'œil peut pâlir ou changer ("œil gris", "œil de poisson", etc.), ou la pupille peut devenir irrégulière (en forme de poire, œil de chat). Les oiseaux manifestant ces défauts dans un œil ou dans les deux yeux doivent être épurés avant qu'ils deviennent maigres ou aveugles.

Les photographies suivantes montrent un œil normal et trois types d'yeux défectueux:



Oeil normal — à garder.



Pupille irrégulière — à épur.



Oeil gris — à épur.



Oeil de poisson — à épur.

